

Utan natrium-associerad risk vid behandling av hyperkalemi

Veltassa är indicerat för behandling av hyperkalemi hos vuxna[5].
Foldern är ämnad för sjukvårdspersonal.
*ACE-hämmare, A II-antagonister, aldosteronantagonister, A II-antagonister+neprilysinhämmare

Veltassa® (patiromer) for oral suspension

Veltassa® - vid behandling av hyperkalemi hos vuxna

Möjliggör fortsatt RAAS-blockad

Ett balanserat natriumintag är rekommenderat för njursvikts- och hjärtsviktspatienter – inte minst på grund av att högt natrium kan minska den kardiorenala nyttan av RAAS-blockad.[1]

Veltassa® är en kaliumbindare som möjliggör initiering och fortsatt behandling med RAAS-blockerare vid hyperkalemi[4] utan natrium-associerad risk.[5] Veltassa verkar lokalt i kolon genom att utväxla kalcium mot kalium.[5]

94%
av patienterna som behandlades med Veltassa kunde stå kvar på RAAS-blockad.**[4]

Väl beprövad

Idag har fler än 400 000 patienter behandlats med Veltassa®.[2] De flesta patienterna (>90%) står kvar på initieringsdosen 8,4g som tillräcklig dygnsdos.[3]

Initiering och monitorering av Veltassa®[5]

Veltassa® kommer i dospåsar om 8,4 g och 16,8 g som blandas med vatten till en suspension och dricks 1 gång/dag.



Blanda med ca 40 ml (3 matskedar) vatten och rör om.

Häll i ytterligare 40 ml vatten och rör om ordentligt. Det är normalt att suspensionen är lite grumlig.

Drick genast. Tillsätt mer vatten om det finns kvar pulver i glaset.

Veltassa®
Vid behandling av hyperkalemi

UTAN NATRIUM-ASSOCIERAD RISK[5]	✓
VERKAR LOKALT I KOLON[5]	✓
MÖJLIGGÖR FORTSATT RAAS-BLOCKAD[4]	✓
VÄLTOLERERAD[3] (över 400 000 behandlade patienter)[2]	✓
INGA KÄNDA LÄKEMEDELSINTERAKTIONER[5] (vid administrering 3 timmar från andra orala läkemedel)	✓
1 DOS/DAG[5]	✓

Veltassa® (patiromer) for oral suspension

Ref:
1: Lambers Heerspink HJ. Kidney Int 2012;82(3):330–7
2: Data on file mars 2021
3: Data on file feb 2019
4: Weir et al N Eng J Med 2015;372(3):211-21
5: Veltassa SmPC

*Verkan av Veltassa® startar 4–7 timmar efter administrering. Veltassa ska inte användas som ersättning för akut behandlng av livshotande hyperkalemi. Veltassa® ska
separeras 3 timmar från andra orala läkemedel.[5]
**Serumkalium bör övervakas när det är kliniskt indikerat och vid förändringar av andra läkemedelsbehandlingar som kan påverka koncentrationen av serumkalium. (t ex RAAS-blockerare eller diuretika).
***Om serumkalium faller till under önskat intervall ska dosen minskas eller sättas ut.
****Andelen patienter som fick avbryta behandlingen med RAAS-blockad var med Veltassa 5% och med placebo 52%[4,5]

Veltassa (patiromer), 8,4 g, 16,8 g och 25,2 g pulver till oral suspension, Rx, (F), Farmakoterapeutisk grupp: V03AE09, läkemedel för behandling av hyperkalemi och hyperfosfatemi. **Indikation:** Behandling av hyperkalemi hos vuxna. **Kontraindikation:** Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. **Varning och försiktighet:** Veltassa ska inte användas som ersättning för akut behandling av livshotande hyperkalemi. Serummagnesium bör övervakas under minst 1 månad efter påbörjad behandling och magnesiumkomplettering övervägas hos patienter som utvecklar låga nivåer av serummagnesium. Nyttan och riskerna med administrering av Veltassa bör utvärderas noga hos patienter med rådande eller tidigare allvarliga gastrointestinala besvär före och under behandling, samt hos patienter med risk för hyperkalcemi. Serumkalium bör övervakas när det är kliniskt indikerat, och efter att Veltassa-dosen har titrerats. Patienter bör instrueras att inte avbryta behandlingen utan att först rådgöra med läkare. Patienter med fruktosintolerans bör inte ta detta läkemedel. Patiromer kan binda vissa oralt samadministrerade läkemedel, vilket skulle kunna minska den gastrointestinala absorptionen av dem. Som förebyggande åtgärd ska administrering av patiromer separeras minst 3 timmar från andra orala läkemedel. Vanliga biverkningar är hypomagnesemi, förstoppning, diarré, buksmärtor och gasbildning. **Graviditet och Amning:** *Graviditet:* Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av patiromer under graviditet. *Amning:* Beslutet om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandlingen med patiromer måste fattas med hänsyn till fördelarna med amning för barnet och fördelarna med behandlingen för kvinnan. **Förmån:** Subventioneras endast för patienter med kronisk njursjukdom (CKD) i stadier 3-5 med eller utan kronisk hjärtsvikt, för vilka behandling med Resonium inte är lämpligt samt för patienter med kronisk hjärtsvikt utan samtidig kronisk njursjukdom. **Baserad på produktresumé från** 2022-10-06. För fullständig förskrivarinformation och priser se www.fass.se. **Vifor Pharma Nordiska AB** www.viforpharma.se, info.nordic@viforpharma.com

SE-PAT-2200031 202212

VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA

CSL Vifor

www.viforpharma.se info.nordic@viforpharma.com