

DU HAR FÅET DENNE PATIENTINFORMATION AF DIN LÆGE

Til dig, der
skal behandles
med Veltassa®



Hvorfor Veltassa®?

Du har fået ordineret Veltassa (patiomer) for at sænke dit kaliumniveau i blodet.

Kalium er vigtigt for, at kroppen fungerer. Men det er hverken godt med for meget eller for lidt kalium i blodet. Veltassa hjælper med at sænke et for højt kaliumniveau, såkaldt hyperkaliæmi.

- I denne brochure får du mere at vide om, hvad Veltassa er, hvordan du skal tage Veltassa, og hvad du ellers skal tænke på.

Læs den omhyggeligt igennem, så får du forhåbentlig svar på dine spørgsmål.

Husk at læse indlægssedlen grundigt igennem, inden du begynder at tage Veltassa.

Vigtigt at vide, inden du begynder at tage Veltassa®

Hvornår skal man tage Veltassa?

- Veltassa er udviklet til behandling af voksne med højt kaliumindhold i blodet.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, inden du påbegynder din behandling, hvis du har:

- problemer med at synke
- alvorlige problemer med maven eller tarmene
- gennemgået omfattende kirurgi i maven eller tarmkanalen

Brug af anden medicin sammen med Veltassa

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager, har taget eller eventuelt

Brochuren erstatter dog ikke den produktinformation, du har fået af din læge, eller brugsanvisningen for Veltassa.

Husk, at du altid kan spørge din læge, hvis der er mere, du vil vide.



planlægger at tage anden medicin.

Sådan skal du tage Veltassa

Formålet med at tage Veltassa er at sænke eller bevare dine kaliumværdier på det niveau, der er optimalt for dig. Derfor er det vigtigt, at du tager din medicin regelmæssigt og kontrollerer kaliumindholdet i dit blod efter instruktion fra din læge.

Mine kaliumværdier

Normalværdierne for kalium ligger som regel mellem 3,5-5,0 mmol/l. Værdierne kan dog variere fra person til person, så spørg din læge om, hvilket interval der er det optimale for dig. Husk at undgå kaliumrig kost. En diætist kan rådgive dig om, hvad du skal spise, og hvad du bør undgå.

Hvad er kalium?

Kalium (K) er et mineral, som er vigtigt for, at hjerte, muskler og nerver fungerer optimalt.

Du får kalium via kosten. Hvis du indtager mere kalium, end din krop har brug for, tager nyrerne sig af det overskydende og sørger for, at kaliumniveauet holdes på et normalt leje.

Symptomer ved højt kaliumniveau (hyperkaliæmi):


- Udtalt træthed.
- Kvalme (følelse af at være syg).
- Følelsesløshed eller prikkende fornemmelse i hænder, ben eller andre dele af kroppen.

- Muskellammelse.
- Smerter i brystet.
- Hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytme.

Hvis hyperkaliæmi ikke behandles, kan det give problemer med hjerterytmen og i svære tilfælde muskellammelse.

Af og til er der slet ingen symptomer, så det er vigtigt at tage Veltassa efter din læges ordination. Hvis du får et eller flere af de nævnte symptomer, skal du straks kontakte din læge eller sygeplejerske.

Sådan udskilles kalium normalt i kroppen




Når dine nyrer ikke fungerer korrekt, kan de ikke skille sig af med det overskydende kalium i blodet. Det fører til hyperkaliæmi.

Kaliumniveauet kan stige med tiden, hvis du har en hjerte- eller nyresygdom. Nogle lægemidler, som anvendes til at beskytte hjertet og nyrerne, kan også give øgede kaliumværdier.

Sådan sænker Veltassa® højt kalium i blodet

Når du tager Veltassa, passerer det gennem mave-tarmkanalen og opsamler det kalium, din krop ikke har brug for. Det forlader derefter din krop via afføringen.



Det skal du tænke på ved behandling med Veltassa®

Mulige bivirkninger

Som med al medicin kan man også få bivirkninger af Veltassa, men alle behøver ikke at få dem.

De mest almindelige er:

- Forstoppelse
- Diarré
- Mavesmerter og luft i maven

Disse bivirkninger er som regel milde eller moderate og plejer at aftage med tiden.

Tal med din læge, hvis du har spørgsmål om bivirkninger. Du kan også læse mere i indlægssedlen, som du får sammen med Veltassa.



Sådan skal du tage Veltassa®

BLAND MED VAND



1. Hæld cirka 40 ml koldt vand (3 spiseskefulde) op i et glas. Hæld alt pulveret fra dosisposen i. Rør godt rundt. Det bliver ikke helt opløst, så forvent, at det ser grumset ud.

HÆLD MERE VAND I



2. Hæld yderligere cirka 40 ml (3 spiseskefulde) koldt vand i. Rør rundt igen. Hæld mere vand i, hvis opløsningen virker for tyk.

DRIK



3. Drik straks. Tilsæt mere vand, hvis der er pulver tilbage i glasset, og drik det hele.

Du må **IKKE** tage Veltassa-pulver, hvis det ikke er blandet med vand.

Brug **IKKE** varmt vand til at blande med.

Blandingen må **IKKE** opvarmes i mikroovnen eller blendes.

Brug **IKKE** Veltassa efter udløbsdatoen.

TAG VELTASSA SAMMEN MED ELLER UDEN MAD

For at huske at tage medicinen kan det være en god idé at tage Veltassa ved samme måltid hver dag.

3 TIMER MELLEM MEDICINEN

Tag Veltassa 3 timer før eller efter anden medicin, så de ikke påvirker hinanden.

Hvis du kommer til at springe en dosis over, skal du tage den så hurtigt som muligt samme dag. Du må ikke gemme den til næste dag. Din læge eller apotekspersonalet kan hjælpe dig med doseringen.



Forkortet produktinformation for Veltassa 8,4 g og 16,8 g pulver til oral suspension patiomer (som patiomersorbitexcalcium)

Denne produktinformation er omskrevet/forkortet i forhold til det af Det Europæiske Lægemiddelagentur godkendte produktresumé dateret 06. oktober 2022. Produktresumeeet kan vederlagsfrit rekvireres fra indehaveren af markedsføringstilladelsen eller findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: <http://www.ema.europa.eu/ema/>. LÆS PRODUKTRESUMÉET FØR ORDINATION, ISÆR MED HENSYN TIL DOSERING, BIVIRKNINGER, ADVARSLER OG KONTRAINDIKATIONER

Indikationer: Behandling af hyperkaliæmi hos voksne. **Dosering og administration:** Den anbefalede startdosis er 8,4 g patiomer én gang dagligt. Den daglige dosis kan justeres i intervaller på en uge eller længere baseret på niveauet af serumkalium og det ønskede målinterval. For at opnå det ønskede målinterval kan den daglige dosis efter behov øges eller reduceres med 8,4 g, dog højst til en maksimumdosis på 25,2 g dagligt. Hvis serumkaliumniveauet falder under det ønskede målinterval, bør dosen reduceres, eller behandlingen ophøre. Hvis en dosis glemmes, skal den glemte dosis tages så hurtigt som muligt samme dag. Den glemte dosis bør ikke tages sammen med den næste dosis. Administration af Veltassa skal ske med 3 timers interval fra indtagelse af andre orale lægemidler. Virkningen af Veltassa indtræder inden for 4–7 timer efter administration. Veltassa bør ikke erstatte nødbehandling af livstruende hyperkaliæmi. Oral brug. Den fulde dosis skal hældes i et glas med ca. 40 ml vand og herefter omrøres. Yderligere ca. 40 ml vand tilføjes, og herefter skal suspensionen omrøres grundigt igen. Pulveret opløses ikke. Blandingen skal indtages inden for 1 time efter klargøring. Følgende væsker eller bløde fødevarer kan benyttes i stedet for vand: Æblejuice, tranebærjuice, ananasjuice, appelsinjuice, druesaft, pæresaft, abrikosnektar, ferskennektar, yoghurt, mælk, fortykningsmiddel, æblesauce, vanilje og chokoladebudding. Kaliumindholdet i væsker eller bløde fødevarer, der anvendes til fremstilling af blandingen, bør medregnes som en del af det anbefalede kaliumindtag for hver enkelt patient. Indtag af tranebærjuice bør generelt begrænses til moderate mængder (for eksempel mindre end 400 ml om dagen) på grund af den potentielle interaktion med andre lægemidler. Veltassa kan tages sammen med eller uden mad. Det må ikke opvarmes eller tilsættes opvarmede madvarer eller væsker. Det må ikke tages i dets tørre form. **Kontraindikationer:** Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. **Advarsler og forsigtighedsregler:** Serumkalium bør overvåges i mindst 1 måned efter påbegyndelse af behandlingen, og magnesiumtilskud bør overvejes til patienter, der udvikler lave niveauer af serumkalium. Fordele og risici ved at administrere Veltassa bør evalueres omhyggeligt før og under behandling af patienter, som har eller tidligere har haft alvorlige gastrointestinale lidelser. Ved ophør af behandling med Veltassa kan serumkaliumniveauerne stige, især hvis behandling med RAAS-inhibitor fortsættes. Patienter skal instrueres i ikke at ophøre med behandlingen uden at konsultere deres læge. Stigninger i serumkalium kan opstå så tidligt som 2 dage efter den sidste Veltassa-dosis. Serumkalium bør overvåges ved klinisk indikation, også efter der foretages medicinændringer, der påvirker serumkaliumkoncentrationen (f.eks. RAAS-inhibitorer eller diuretika), og efter Veltassa-dosis er titreret. Veltassa indeholder sorbitol. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans. Veltassa indeholder calcium. Fordelene og risiciene ved administration af dette lægemiddel bør evalueres omhyggeligt hos patienter med risiko for hyperkalcæmi. **Interaktioner:** Patiomer har potentialet til at binde visse co-administrerede lægemidler, hvilket kan reducere deres absorption i mave-tarm-kanalen. Da patiomer ikke absorberes eller metaboliseres i kroppen, har det en begrænset indvirkning på virkningen af andre lægemidler. Som en sikkerhedsforanstaltning bør administration af patiomer ske mindst 3 timer før eller efter andre orale lægemidler. In vitro-studier har vist potentiel interaktion mellem patiomer og bisoprolol, carvedilol, mycophenolate mofetil, nebivolol, quinidin og telmisartan. **Graviditet og amning:** Som en sikkerhedsforanstaltning foretrækkes det at undgå brug af Veltassa under graviditet. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med patiomer seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen. **Bivirkninger:** Almindelig ($\geq 1/100$ til $< 1/10$): Hypomagnesæmi, forstoppelse, diarré, mavesmerter, luft i maven. Ikke almindelig ($\geq 1/1.000$ til $< 1/100$): Kvalme, opkastning. **Overdosering:** Da overdrevne doser af Veltassa kan resultere i hypokaliæmi, bør niveauerne af serumkalium overvåges. Patiomer udskilles efter ca. 24 til 48 timer, baseret på den gennemsnitlige gastrointestinale transitid. Såfremt det besluttes, at lægelig behandling er nødvendig, kan relevante foranstaltninger til gendannelse af serumkalium overvejes. **Pakningsstørrelser og priser:** Æske med 30 breve. Se www.medicinpriser.dk for dagsaktuelle priser. **Tilskud:** Ej tilskudsberettiget. **Udlevering:** B. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France, 100–101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris La Défense Cedex, Frankrig. **Representant:** Vifor Pharma Nordiska AB, Gustav III:s Boulevard 46, SE-169 73, Solna, Sverige. **Revisionsdato:** 24.11.2022.