Veltassa® (patiromer)

How to initiate and monitor

Veltassa® is indicated for the treatment of hyperkalaemia in adults[1]

Veltassa®

Initiate and monitor[1]



* The onset of action of Veltassa occurs 4-7 hours after administration. Veltassa should not replace emergency treatment for life-threatening hyperkalaemia. Administration of Veltassa should be taken together with or without food and separated by 3 hours from other oral medicinal products

** Measure of potassium should be monitored when clinically indicated, including after changes are made to treatments that affect the serum potassium concentration (e.g. RAAS inhibitors and diuretics)

*** If serum potassium falls below the desired range, the dose should be reduced or discontinued

Veltassa®

How to prepare

1. Mix

Mix 40 mL of water with an entire sachet of Veltassa®, then stir

2. Add

Add another 40 mL of water and stir thoroughly. The powder will not dissolve and the mixture will look cloudy*

3. Drink

Drink immediately. If powder remains in the glass after drinking, repeat steps 2 and 3 to ensure the entire dose is taken

* Additional volumes of water can be added if desired for liquid consistency purposes.

1. Veltassa SPC, se fass.se

Veltassa (patiromer), 8,4 g, 16,8 g och 25,2 g pulver till oral suspension, Rx, (F), Farmakoterapeutisk grupp: V03AE09, läkemedel för behandling av hyperkalemi och hyperfosfatemi. **Indikation:** Behandling av hyperkalemi hos vuxna. **Kontraindikation:** Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. **Varning och försiktighet:** Veltassa ska inte användas som ersättning för akut behandling av livshotande hyperkalemi. Serummagnesium bör övervakas under minst 1 månad efter påbörjad behandling och magnesiumkomplettering övervägas hos patienter som utvecklar låga nivåer av serummagnesium. Nyttan och riskerna med administrering av Veltassa bör utvärderas noga hos patienter med rådande eller tidigare allvarliga gastrointestinala besvär före och under behandling, samt hos patienter med risk för hyperkalcemi. Serumkalium bör övervakas när det är kliniskt indikerat, och efter att Veltassa-dosen har titrerats. Patienter bör instrueras att inte avbryta behandlingen utan att först rådgöra med läkare. Patienter med fruktosintolerans bör inte ta detta läkemedel. Patiromer kan binda vissa oralt samadministrerade läkemedel, vilket skulle kunna minska den gastrointestinala absorptionen av dem. Som förebyggande åtgärd ska administrering av patiromer separeras minst 3 timmar från andra orala läkemedel. Vanliga biverkningar är hypomagnesemi, förstoppning, diarré, buksmärtor och gasbildning. **Graviditet och Amning:** *Graviditet:* Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av patiromer under graviditet. *Amning:* Beslutet om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandlingen med patiromer måste fattas med hänsyn till fördelarna med amning för barnet och fördelarna med behandlingen för kvinnan. **Förmån:** Subventioneras endast för patienter med kronisk njursjukdom (CKD) i stadier 3-5 med eller utan kronisk hjärtsvikt, för vilka behandling med Resonium inte är lämpligt samt för patienter med kronisk hjärtsvikt utan samtidig kronisk njursjukdom. **Baserad på produktresumé från** 2022-10-06. För fullständig förskrivarinformation och priser se www.fass.se. **Vifor Pharma Nordiska AB** www.viforpharma.se, info.nordic@viforpharma.com

SE-PAT-2200028 202212

VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA

CSL Vifor

www.viforpharma.se • info.nordic@viforpharma.com