

服用 VELTASSA 快速指南

将本指南放在手边，提醒您服用医生开具的 VELTASSA。



VELTASSA 如何发挥作用且保持有效



在某项临床研究中，高达 **95%** 服用 VELTASSA 的人 钾水平降低，之后保持在正常水平 (3.8 至 <5.1 mEq/L)。

VELTASSA 是用于治疗血液中高钾（高钾血症）的处方药。VELTASSA 与结肠中的钾相结合，将它们从体内排出去。身体不吸收 VELTASSA。目前不知道 VELTASSA 对儿童是否安全和有效。

如何服用 VELTASSA

- 每天与或不与食物一同服用 VELTASSA。
- VELTASSA 使用一次性包装，与水混合后饮用
- 严格遵医嘱服用 VELTASSA。使用 VELTASSA 治疗期间，医生会检查您的血液中的钾的水平，如有需要，会更改您的剂量。
- 在某研究中，大多数人发现 VELTASSA 没有任何味道和气味。



确保在口服任何其他药物之前或之后 **至少 3 个小时**再服用 VELTASSA。

VELTASSA 为白色至淡棕色粉末。与水混合时，VELTASSA 会变色。

✓ 必须

- 单独制备每剂 VELTASSA
- 遵循医生为您开具的饮食后服药嘱咐
- 只用水混合 VELTASSA

✗ 切勿

- 切勿 服用不用水混合的 VELTASSA
- 切勿 加热、微波 VELTASSA 或将其添加到热食物或液体中
- 切勿 在搅拌机中混合 VELTASSA

您应当服用医生开具的 VELTASSA。除非您已经咨询医生，否则切勿停用 VELTASSA。

重要安全信息

哪些人不应该服用 VELTASSA?

如果您对 VELTASSA 或其任何成分过敏，切勿服用它。

我在服用 VELTASSA 前应该告知我的医生什么内容?

服用 VELTASSA 前，告知医生有关您的所有医疗状况，包括是否：

- 有排便问题，包括是否便秘、肠阻塞（堵塞）或大便干硬，无法排出直肠（嵌塞）
- 直肠手术后存在问题

请参阅下页上的附加重要安全信息。

请点击[此处](#) 获取完整处方信息或转到 www.veltassa.com/pi.pdf

如何制备 VELTASSA



混合

用量杯量 1/3 杯的水。将一半的水倒入空饮水杯。将 VELTASSA 包装中的所有内容物倒入装水的饮水杯。*将混合物搅拌均匀。

*针对您的处方剂量，您可能需要 1 包以上 VELTASSA。确保遵循以上开具的剂量说明。



VELTASSA 药剂准备 建议最低水量为 1/3 杯 (约 3 盎司)。†

†所有剂量的规定起始水量大约为 1/3 杯的一半。在初始水量中搅拌均匀后，加入剩余的水。



加水

将量杯中剩余的水倒入含有混合物的饮水杯。将混合物搅拌均匀。粉末不会溶解，混合物看起来很浑浊。如果混合物太浓，您可再加点水。



饮用

立刻饮用混合物。如果饮用后杯中留有粉末，再加点水、搅拌，然后将剩余的混合物喝完。根据需要重复上述步骤，确保您服用了整剂的 VELTASSA。

重要安全信息 (续)

我在服用 VELTASSA 前应该告知我的医生什么内容? (续)

了解服用的药物保存一份药物清单，在收到新药时出示给医生和药剂师告知医生您服用的所有药物，包括处方药和成药、维生素、草药补充剂。

VELTASSA 可能具有的副作用是什么?

VELTASSA 可能造成严重的副作用，包括：

- 血液中镁含量较低 (低镁症)。服用 VELTASSA 时，会出现血液中镁含量较低情况。。使用 VELTASSA 治疗期间，医生会检查您的血液中的镁的水平，会开具 镁补充剂。

VELTASSA 最常见的副作用包括：便秘、低镁症、腹泻、恶心、腹部不适和排气。

告知医生困扰您的或未去除的副作用。以下是 VELTASSA 可能具有的副作用。您可以拨打 1-800-FDA-1088 报告副作用。

本文件中提供的风险信息并不全面，您必须咨询医生，了解您的医疗状况或治疗方案。若要了解有关 VELTASSA 更多内容，请咨询保健服务提供者或药剂师。

请点击[此处](#) 获取完整处方信息或转到 www.veltassa.com/pi.pdf



PP-US-VEL-01264. ©2019 Relypsa, Inc 版权所有。保留所有权利。
所有标志、商标和服务标记均为 Relypsa, Inc. 的财产。

在 VELTASSA.com 了解更多信息